胃鏡 / 小腸鏡 / ERCP 檢查準備說明

EGD / Enteroscopy / ERCP Prep Instructions · Traditional Chinese

unio SPECIALTY CARE

請今天就閱讀本說明。有些藥物必須在檢查前 **7 天**停用。

取消政策：需要取消或改期嗎？請至少提前 **5 個工作日**（週末不算）打電話給我們。如果您沒有來或太晚取消，需支付 **300 美元**費用。

您的檢查時間

日期: ____/____/_____ **到達時間:** _____ **AM/PM** **檢查時間:** _____ **AM/PM**

醫生: ☐ **DR. KEN D. NGUYEN** ☐ **DR. TIM CHEN** ☐ **DR. DANA PAN**

☐ VALLEY DIGESTIVE HEALTH CENTER 488 E SANTA CLARA ST #102, ARCADIA, CA 91006
☐ USC ARCADIA HOSPITAL 300 W HUNTINGTON DR, ARCADIA, CA 91007
☐ GOOD SAMARITAN HOSPITAL 1245 WILSHIRE BLVD #200, LOS ANGELES, CA 90017

*請按**到達時間**到達。本說明中的所有時間，都是從**檢查時間**往前計算。*

免費取消或改期的最後一天：

準備工作

- **安排接送：**檢查後必須由一位成年家人或可信賴的朋友開車送您回家，您**不可以自己開車**。

藥物：什麼時候停用

- 請在表格中找到您的藥物，並在表格所列的日期**停止服用**（從檢查當天往前算）。如果您的藥物**不在**本頁上，請照常服用。
- **阿司匹林** (aspirin)：**請繼續服用**，除非醫生另有指示。
- **抗凝血藥（稀釋血液的藥物）：**停藥前，請先諮詢為您開這種藥的醫生。如果您裝有**金屬（機械）心臟瓣膜**，或在過去一年內曾經**中風**或放置**心臟支架**，請先聯繫我們，您需要特別的指示。

停藥時間	藥物	什麼時候重新開始服藥
檢查前 7 天	抗凝血 prasugrel (Effient)	**抗凝血藥和鐵劑：**檢查後，醫生或護士會告訴您。 **糖尿病藥和減肥藥：**恢復正常飲食後再開始服用。 ***Metformin（二甲雙胍）：**如果您有腎病，或檢查時用了 X 光造影劑（例如 ERCP），檢查後要再等 2 天（48 小時）。
	糖尿病 / 減肥 **每週打一次的針：** semaglutide (Ozempic, Wegovy), dulaglutide (Trulicity), tirzepatide (Mounjaro, Zepbound)	
	減肥 phentermine (Adipex-P, Lomaira)	
檢查前 5 天	抗凝血 warfarin (Coumadin, Jantoven) · clopidogrel (Plavix) · ticagrelor (Brilinta)	
	鐵劑 鐵劑：硫酸亞鐵、富馬酸亞鐵或葡萄糖酸亞鐵 (Feosol, Slow Fe, Ferro-Sequels, Fergon)	
檢查前 4 天	抗凝血 dabigatran (Pradaxa) — **如果您有腎病**	
	糖尿病 ertugliflozin (Steglatro)	
檢查前 3 天	糖尿病 canagliflozin (Invokana) · dapagliflozin (Farxiga) · empagliflozin (Jardiance)	
檢查前 2 天	抗凝血 rivaroxaban (Xarelto) · apixaban (Eliquis) · edoxaban (Savaysa) · dabigatran (Pradaxa) — 如果您的腎功能正常	
檢查當天早上（不要服用）	糖尿病 metformin* (Glucophage, Glumetza, Fortamet, Riomet) · glipizide (Glucotrol), glyburide (DiaBeta, Glynase), glimepiride (Amaryl) · semaglutide 口服片 (Rybelsus, Wegovy 口服片) · sitagliptin (Januvia), linagliptin (Tradjenta)	

胰島素 — 不要自己停用胰島素

胰島素種類	檢查前一天	檢查當天早上
長效: glargine (Lantus, Toujeo, Basaglar), detemir (Levemir), degludec (Tresiba)	注射平時劑量的**一半 (½)**	注射平時劑量的**一半 (½)**
預混型和 NPH: Humulin 70/30, Novolin 70/30, Novolog 70/30, Humalog 75/25, Humalog 50/50, NPH (Humulin N, Novolin N)	注射平時劑量的**一半 (½)**	注射平時劑量的**一半 (½)**
餐時（速效）: lispro (Humalog), aspart (Novolog), glulisine (Apidra), regular (Humulin R, Novolin R)	照常隨餐注射	**不要注射**

- 檢查前一天請**至少測量 3 次**血糖，出門前再測量一次。
- 請隨身攜帶果汁或葡萄糖片，以防血糖過低。
- 血糖過高時，只有在醫生事先指導過的情況下，才可以額外注射少量胰島素（矯正劑量）。

檢查當天

- **檢查時間前 8 小時：** 停止吃所有固體食物和牛奶。您仍然可以喝**清流質**（見清單）。
- **檢查時間前 3 小時：** 停止喝任何東西——不喝水、不喝清流質、不吃糖、不嚼口香糖。（只可用一小口水吞藥。）
- 帶上**接送您的人**和您**所有藥物的清單**。

您早上要吃的其他藥：出門前，請用**一小口水**服用**所有不在**停藥清單（第 1 頁）上的早上藥物——**包括降血壓藥**。
糖尿病：當天早上**不要**服用糖尿病藥片。胰島素請按照**胰島素**表格注射。

清流質

清流質 — 可以喝

- 白開水
- Gatorade、Pedialyte 或 Powerade
- 清湯（不含任何料）
- 黑咖啡或茶（不加奶、不加奶精）
- 汽水（有氣或無氣）
- Kool-Aid 或其他果味飲料
- 無果肉的透明果汁（蘋果汁、白葡萄汁）
- 果凍 (Jell-O)、冰棒、硬糖

不可以

- 任何**紅色或紫色**的東西
- 酒
- 牛奶或奶精（包括非乳製奶精）
- 有麵條或蔬菜的湯
- 有果肉的果汁（例如橙汁）
- 任何**看不透**的飲料
- 固體食物

檢查之後

- **檢查結果：**如果我們做了活檢（取一小塊組織化驗），結果需要 7–10 個工作日。醫生會打電話或寄信通知您。
- **抗凝血藥：**醫生或護士會告訴您什麼時候重新開始。
- **糖尿病藥：**恢復正常飲食後再開始服用。
- 您接受了鎮靜麻醉，當天餘下的時間**不可以開車**。
- 檢查時注入的空氣可能引起輕微喉嚨痛、腹脹或排氣。這是正常現象，很快會自行消失。
- 如果您有**嚴重腹痛、發燒、嘔吐、黑色大便，或大便或嘔吐物裡有血，請立即打電話**給我們：626-898-4560。緊急情況請撥打 911。

我已收到並明白本說明和取消/失約（No Show）政策（300 美元費用）。我明白如需取消，必須在預約時間至少 5 個工作日前通知。

病人姓名（請用正楷）: _____

X _____ **日期:** _____

病人簽名